

Prélèvements obligatoires inscrits dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français - 2017

Prélèvements MCE, AVE à faire effectuer après le 1er janvier et avant toute saillie dans un laboratoire agréé

	POUR LA JUMENT			POUR L'ETALON
	MAIDEN	VIDE	PLEINE / SUITEE	Les tests métrite et artérite peuvent être réalisés à partir du 1er décembre N-1
MÉTRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE + KLEBSIELLES ET PSEUDOMONAS (obligatoire)	Site : clitoris (sinus et/ou fosse)			Site : fosse urétrale
	résultats négatifs : ok	résultats négatifs : ok	résultats négatifs : ok	résultats négatifs : ok
ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE	1 résultat sérologique négatif : ok 2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle : ok 1 résultat sérologique positif stable ou déclinant par rapport à 1 résultat stable ou déclinant de N-1 ou N-2, un laboratoire différent est toléré : ok			1 résultat sérologique négatif : ok 1 résultat sérologique positif avec certification de vaccination conforme : ok 1 résultat sérologique positif sans certification de vaccination conforme, à effectuer : - virologie dans un seul sperme avec résultat négatif : ok - virologie positive, étalon excréteur => protocole spécifique
ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS				Test de Coggins : 1 résultat négatif pour une 1 ^{ère} approbation à la monte publique datant de moins de 3 mois, puis datant de moins de 3 ans
DOURINE				1 résultat sérologique négatif (Fixation Complément) de moins de 3 mois si séjour dans les 12 derniers mois dans pays non indemne de Douvine (ex : Italie)

Vaccinations obligatoires inscrites dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français - 2017

GRIPPE	Avant la saillie	Avant la demande de carnet de monte
	Vaccination préalable à la DPS et < 1 an : ok Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines 1er rappel à 6 mois, puis un rappel au moins annuel : ok	Vaccination préalable à la demande de carnet et < 1 an : ok Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines 1er rappel à 6 mois, puis un rappel au moins annuel : ok
RHINOPNEUMONIE	Avant la saillie	Avant la demande de carnet de monte
	Vaccination préalable à la DPS et < 1 an : ok Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines, 1er rappel à 6 mois, puis rappel au moins annuel (mieux tous les six mois) : ok	Vaccination préalable à la demande de carnet et < 1 an : ok Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines, 1er rappel à 6 mois, puis rappel au moins annuel (mieux tous les six mois) : ok
Toute rupture dans un protocole de vaccinations nécessite une primo-vaccination		

Vaccination fortement recommandée inscrite dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français - 2017

Vaccination Etalon (Boute-en-train) Uniquement

ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE		ARTERVAC® Sérologie négative puis primo-vaccination 2 injections espacées de 3 à 6 semaines sur un étalon maintenu en isolement Rappel tous les 6 mois (tolérance de 2 mois)
		Lors d'une rupture du protocole de vaccination : Sérologie négative puis primo-vaccination 2 injections espacées de 3 à 6 semaines Rappel tous les 6 mois (tolérance de 2 mois) Sérologie positive : virologie dans un seul sperme avec résultat négatif et reprise vaccination Dernier vaccin > 1 an : primo vaccination - si < 1 an : rappels tous les 6 mois (+ 2 mois)